BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 8 mars 1899.

Présidence de M. A. GIARD, Vice-Président.

MM. A. Barbey, de Moncherand-sur-Orbe, H. du Buysson, de Broût-Vernet, Ch. Demaison, de Reims, R. de la Perraudière, de Jarzé, A. Raffray, de Cape-Town, J. Vachal, d'Argentat, assistent à la séance.

Correspondance. — Le Président donne lecture de la lettre suivante que lui a adressée M. H. d'Orbigny :

Monsieur le Président,

Je ne puis vous dire combien j'apprécie le grand honneur que m'a fait la Société entomologique de France en me décernant le Prix Dollfus pour l'année 1898. Je remercie tous mes collègues qui m'ont si aimablement donné leurs suffrages, particulièrement ceux qui ont bien voulu me communiquer avec tant d'obligeance les matériaux qu'ils possédaient et m'ont aussi bien souvent aidé de leurs conseils; c'est seulement grâce à leur concours que j'ai pu faire mon travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

H. d'Orbigny.

Don de la collection A. Mauppin. — Le Président annonce que Madame Torchon, sœur de notre regretté collègue A. Mauppin, vient de faire à la Société une donation importante.

Cette donation comprend tout ce qui dans la succession Mauppin a trait à l'Entomologie, c'est-à-dire :

1° La collection de Coléoptères d'Europe recueillie par A. Mauppin, collection en parfait état de conservation et précieuse par le soin avec lequel sont indiquées les localités et les dates des captures.

2° La collection de Coléoptères de Just Bigot.

3° La collection d'Hémiptères de Just Bigot.

4° Quelques cartons d'insectes exotiques (Coléoptères, Hyménoptères, etc.).

5° Un certain nombre de livres d'Entomologie, notamment le Genera des Coléoptères de Jacquelin Duval, la Monographie des Élatérides de Candèze, les Staphylinides de France de Cl. Rey, etc.

6° Des flacons et autres ustensiles de chasse qui, suivant l'intention de la donatrice, pourront être distribués à des entomologistes débutants et peu fortunés.

Sur la proposition du Président, la Société vote à l'unanimité de chaleureux remerciements à Madame Torchon pour cette généreuse donation qui perpétuera le souvenir d'un entomologiste zélé et dévoué aux intérêts de la science.

Proposition d'élection de membres honoraires. — Le Président donne lecture de la proposition suivante signée par MM. H. Boileau, H. Donckier, J. de Gaulle, P. Lesne et J. Magnin :

Messieurs,

Par suite des pertes regrettables que nous avons faites depuis quatre ans, la liste de nos membres honoraires est fortement diminuée. Nous vous proposons de procéder à de nouvelles élections et nous espérons que notre proposition sera prise en considération.

Conformément à l'article 13 du Règlement, cette proposition est renvoyée au Conseil, qui aura à fournir, dans la prochaine séance, un rapport sur la question d'opportunité.

Admission. — M. François Picard, élève à l'Institut agronomique, 29, faubourg Saint-Jacques, Paris. *Coléoptères, Hyménoptères.*

Présentations. — M. Auguste Barbey, expert forestier, Montcherand-sur-Orbe, canton de Vaud (Suisse), [*Entomologie forestière, Coléoptères*] présenté par M. L. Bedel. — Commissaires-rapporteurs MM. E. Dongé et Ph. Grouvelle.

— M. V. Béguin, pharmacien de 1re classe, 43, avenue de la République, Paris, [*Coléoptères, pr. Vésicants*] présenté par M. H. Donckier. — Commissaires-rapporteurs MM. A. Fumouze et Guimond.

— M. M.-A. Jeanson, 74, avenue Victor Hugo, à Rueil (Seine-et-Oise), [*Coléoptères de France*] présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs MM. Ch. Lahaussois et A. Léveillé.

— M. G. de Rocquigny-Adanson, rue Voltaire, à Moulins (Allier),

[*Lépidoptères, Géonémie et Phaenologie entomologiques*] présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. l'abbé J. de Joannis et G.-A. Poujade.

Changements d'adresse. — M. J. Sainte-Claire-Deville, lieutenant d'artillerie, fort du Barbonnet, par Sospel (Alpes-Maritimes).

— M. W.-L. Distant, Highfied, Uper Warlingham, Surrey (Angleterre).

Communications.

Description d'un Goliathide nouveau [Col.]

Par L. Fairmaire.

Neophoedimus melaleucus n. sp. — Long. 36 à 39 mill. ♂, 28 mill. ♀. — *Oblongus, prothorace convexo, elytris vix convexis, nigro-ebenus, valde nitidus, prothorace utrinque vitta lata laterali densissime setulis squamosulis albidis tecta, elytris similiter albido-vestitis, macula humerali, sutura et vitta marginali (plus minusve) denudatis, corpore subtus magis griseo-vestito, medio cum prosterni lateribus denudato; ♂ fronte inter oculos late impressa et prope oculos cornu leviter incurvo, basi angustato armata, clypeo antice in cornu lato, retrorsum arcuato, apice dilatato, fortiter arcuatim furcato, spatio intermedio medio angulato; prothorace transverso, amplo, elytris haud angustiore, antice sat fortiter rotundatim angustato, dorso polito, lateribus marginato, basi fere recta, angulis rotundatis; scutello sat magno, acuto, polito; elytris ovatis, ab humeris postice leviter attenuatis, parum convexis, subtilissime dense coriaceo-punctatis, apice rotundatis, ante angulum suturalem sinuatis, hoc angulo acuto, sutura polita; pygidio dense griseo-setosulo, prosterno inter coxas angusto, acuminato, his fere contiguis, mesosterno angulato-producto, apice obtuso, pedibus validis, tibiis inermibus, anticis vix sensim arcuatis, apice breviter mucronatis; ♀ minor, capite subquadrato, concavo-asperato, margine, antico emarginato, fronte transversim valide carinata, lateribus elevatis; prothorace minus convexo; elytris utrinque obsolete bicostulatis; pygidio et abdomine fere denudatis; tibiis anticis valde tridentatis, tarsis gracilioribus.*

Haut Tonkin : Dong-Van; collection R. Oberthür.

Ce superbe insecte a beaucoup d'analogie avec le *N. Auzouxi*, mais il a plutôt une physionomie africaine comme celle des *Neptunides*. Il

diffère beaucoup de l'*Auzouxi* d'abord par la coloration et la vestiture, mais surtout par l'absence de corne sur le devant du corselet et par la présence d'une petite corne près de chaque œil. La corne antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

Description d'un *Ernobius* nouveau [Col.] de la France méridionale

Par le Dr A. Chobaut.

Ernobius cupressi n. sp. — ♂ Allongé; d'un roux clair, avec la tête, les antennes et le corselet plus foncés, l'extrémité apicale des élytres d'un jaune rougeâtre et les pattes testacées; garni d'une pubescence blanchâtre, fine, serrée. Yeux très saillants. Tête (y compris ceux-ci) aussi large que le prothorax dans sa plus grande largeur. Antennes atteignant les trois quarts de la longueur du corps, avec les 8 premiers articles courts, contigus, les 3 derniers allongés, formant une massue un peu plus épaisse que le reste de l'antenne, chacun de ceux-ci considéré séparément au moins aussi long que les 8 premiers pris ensemble; 1er en massue, peu allongé; 2e presque carré; 3e à 8e un peu plus minces que les deux premiers; 3e et 4e égaux, légèrement plus longs que le 2e; 5e et 7e égaux entre eux, un peu plus longs que les 3e et 4e; 6e et 8e égaux entre eux, légèrement plus courts que les 3e et 4e. Prothorax transversal, finement ponctué, quoique un peu plus fortement que la tête et les élytres, à côtés faiblement explanés, à angles antérieurs presque droits, légèrement émoussés au sommet, à angles postérieurs tout à fait arrondis, égal sur son disque, sans tubercules ni éminences, muni seulement d'une petite dépression transversale au devant des angles postérieurs. Écusson subquadrangulaire, à pubescence concolore. Élytres très allongés, plus de quatre fois plus longs que le prothorax, à côtés parallèles, arrondis au sommet, un peu plus foncés vers la tache apicale pâle qui, ainsi mieux tranchée, se termine angulairement sur la suture et remonte le long des côtés. Pattes allongées, avec les fémurs plus foncés. — Long. 1,8 mill.



♀ ♂

Antennes de l'*Ernobius cupressi* n. sp.

♀ Plus claire, avec la tête seulement un peu plus foncée et l'extrémité

apicale des élytres indistinctement tachée de jaune rougeâtre. Yeux moins saillants. Antennes avec les 8 premiers articles comme chez le ♂, les 3 derniers plus courts et, pris ensemble, à peu près deux fois aussi longs seulement que le reste de l'antenne. — Long. 1,7 mill.

J'ai pris cette espèce, le 15 mai 1891, en battant une rangée de Cyprès (*Cupressus fastigiata* de Cand.) dans le vallon de Candau, près de Pont-d'Avignon (Gard). Les deux seuls exemplaires que j'ai rencontrés étaient accouplés bout à bout; c'était le ♂ et la ♀ que je viens de décrire.

Par son prothorax à disque égal, à côtés faiblement explanés, à angles antérieurs presque droits, légèrement émoussés, les articles de 3 à 8 de ses antennes courts et contigus, sa massue antennaire à articles un peu plus épais que les précédents, l'*Ernobius cupressi* vient se placer près de l'*E. densicornis* Muls. dont il diffère par sa taille beaucoup plus petite et surtout par ses antennes, chacun des trois derniers articles égalant, chez le ♂, les huit premiers réunis, caractère suffisant à lui seul pour le distinguer de tous les *Ernobius* connus. La taille est remarquablement petite. Seuls quelques exemplaires de l'*E. parens* pourraient, à ce point de vue, lui être comparés. L'examen des antennes permettra de séparer facilement ces deux espèces.

Note sur *Sefrania Bleusei* Pic [Col.]

Par le Dr A. Chobaut.

Je possédais un exemplaire de ce curieux Coléoptère qui me venait des chasses que M. L. Bleuse a bien voulu effectuer pour moi dans le Sud-Oranais, de mai à juillet 1896. N'en ayant qu'un seul exemplaire, je n'avais pas encore osé décrire ce remarquable Dermestide.

M. Bleuse a bien voulu me céder un de ses types, absolument conforme au sujet que je possédais déjà.

L'étude de cet insecte me permet de compléter la description de M. Pic sur les quatre points suivants :

1° Les antennes sont bien conformées comme le dit cet auteur, mais l'anatomie des articles intermédiaires est moins embrouillée qu'elle ne le lui semble. En réalité, les articles 4 à 6 sont transversaux, égaux entre eux, un peu moins longs que le 3e qui est étranglé à la base; les articles 7 et 8 sont un peu plus larges et un peu plus courts que les précédents; rien à modifier à la description des articles basilaires et terminaux.

2° La taille que M. Pic assigne à son espèce, 3,5 à 4 millimètres, me semble trop élevée. Le sujet cédé par M. Bleuse n'a que 3 millimètres, et celui que j'avais déjà en collection, 2,8 mill. *Sefrania Bleusei* ne rappelle que de loin l'aspect d'*Attagenus tigrinus* F. Sa taille est bien plus petite et sa forme beaucoup plus étroite.

3° Il me paraît évident que la ♀ de *Sefrania Bleusei* est encore inconnue et que le mâle seul a été décrit. La massue antennaire de cette ♀ doit se composer aussi de 3 articles, mais moins allongés que ceux du ♂.

4° La place assignée au genre *Sefrania* ne me semble pas suffisamment précise. L'auteur dit bien qu'il « rappelle le genre *Attagenus* », mais il trouve nécessaire aussi de le distinguer « des Cébrionides et genres voisins ».

En réalité le genre *Sefrania* appartient aux Dermestides dont il offre, en dehors de la forme, tous les autres caractères. Il est bien éloigné des Cébrionides avec qui il est très inutile de le comparer. Il vient nettement se placer en tête du genre *Attagenus* dont il n'est qu'une coupe, au même titre que les *Megatoma* et *Lanorus*.

Le tableau suivant permettra de distinguer les uns des autres les ♂ de ces trois sous-genres.

A. Massue antennaire formée de trois articles dont chacun est au moins aussi long que les 8 premiers pris ensemble. ..... *Sefrania* Pic.

A'. Massue antennaire formée de trois articles dont le dernier est trois ou quatre fois aussi long que les deux précédents pris ensemble..... *Megatoma* Rttr. (nec Herbst).

A''. Massue antennaire formée de trois articles dont le dernier est seulement deux fois aussi long que les deux précédents pris ensemble..... *Lanorus* Muls.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des Séances*), 1899, I, 8 et 9. — A. Fourtau : Sur la provenance des valves de Crustacés ostracodes fossiles tombées à Oullins près de Lyon le 24 septembre 1898.

Académie des Sciences de Cracovie (*Bulletin international*), janvier 1899. ⊙.

Agriculture and Forestry (Report), 1898-1899. — W. Froggatt : Report of the Entomologist. — M. Blunno : Report of the viticultural Expert.

Annals and Magazine of Natural History, sér. VIII, 3, n° 15. — C. Chilton : Note on the sexual Characters of *Ligia oceanica*, (pl.). — A.-G. Butler : A Revision of the Pierine Genus *Huphina*, with Notes on the Seasonal Phases and Descriptions of new Species. — H. Druce : Descriptions of some new Species of Heterocera from Tropical America, Africa and the Eastern Islands. — T.-R. Stebbing : On the true *Podocerus* and some new Genera of Amphipods. — E.-M. Sharpe : Description of two new Butterflies collected by Major E.-M. Woodward in Nandi, Equatorial Africa.

Canadian Entomologist (*The*), XXXI, 2, 1899. — H.-F. Wickam : The Coleoptera of Canada, XXX : The Lucanidae of Ontario and Quebec, (fig.). — J.-B. Smith : A new Species of *Asteroscopus* Bd. — H.-G. Dyar : Description of Larva of *Ingura delineata* Guen. — E.-M. Walker : Notes on some Ontario Acridiidae. — Part III. — T.-D.-A. Cockerell : The Odour of Coccidae. — W. Knauss : Collecting Notes on Kansas Coleoptera. — C. Young : Descriptions of Sawfly Larvae. — T.-D.-A. Cockerell : Three new Coccidae from Brazil. — J.-D. Tinsley : Contributions to Coccidology. — I. — T.-W. Fyles : Early Stages of *Trigonophora periculosa* Gn.

Entomologist (*The*), XXXII, 430, 1899. — T.-A. C. : British Lepidoptera. — J.-W. Tutt : Nomenclature. — Phylogeny. — Synonymy. — L.-B. Prout : The Nomenclature of British Lepidoptera. — W.-J. Lucas : Dragonflies in 1898. — M. Jacoby : Some new Genera and Species of Phytophagous Coleoptera from India and Ceylon. — Notes diverses.

Entomologist's Monthly Magazine (*The*), mars 1899. — K.-J. Morton : Entomological Notes from Glen Lochay and Loch Tay including Record of an *Oxyethira* new to Britain. — G.-C. Champion : *Stichoglossa semirufa* Er. : a Genus and Species of *Staphylinidae* new to the British List. — R.-C.-L. Perkins : Description of two new Species of *Rhyncogonus* (*Otiorhynchini*). — A.-J. Chitty : *Amara strenua* Zimm., and other *Coleoptera* in Flood-rubbish at Iwade, North Kent. — R. Mac Lachlan : *Trichoptera*, *Planipennia* and *Pseudo-Neuroptera* collected in the District of the Lac de Joux (Swiss Jura) in 1898. — E.-E. Austen : On the British Species of the Dipterous Genus *Loxocera* Mg. (Fam. *Psilidae*), with the Des-

cription of a new Variety. — C.-A. Briggs : Two Species of *Ephemeridae* new to Britain. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (*La*), 1er mars 1899. — Notes spéciales et locales.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, IV, 5, 1899. — E.-H. Rübsaamen : Wie präpariert man Cecidozoën? — Dr E. Fischer : Beiträge zur experimentellen Lepidopterologie, XI, pl. et fig.). — O. Schultz : Ueber Scheinzwitter von *Ocneria dispar* L. — Fr.-W. Konow : Analytische Tabelle zum Bestimmen der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung *Chalastogastra.* — Notes diverses.

Museo nacional de Costa-Rica (Informe del primer Semestre de 1898 a 1899).⊙

Naturaliste (*Le*), 1er mars 1899. — Cap. Xambeu : Mœurs et Métamorphoses de l'*Asilus crabroniformis* L., (Asile frelon). — A. Daguin : Les insectes comestibles dans l'antiquité et de nos jours.

New York Agricultural Experiment Station (*Bulletin*), n° 146-149, 1898.⊙

R. Accademia dei Lincei (*Atti*), 1899, I, 3.⊙

Revue des Travaux Scientifiques, XVIII, 10 et 11, 1898.

Rivista di Patologia vegetale, VI, 11 et 12, VII, 1-4, 1898. — A. Berlese et G. Leonardi : Notizie intorno alle Cocciniglie americane che minacciano la frutticultura europea, (fig.) – Ant. Berlese : Fenomeni che accompagnano la fecondazione in taluni Insetti, I, II (pl.). — G. Leonardi : Monografia del Genere *Aspidiotus.* — B. Buffa : Contributo allo Studio anatomico della *Heliothrips haemorrhoidalis.* — Notes et renseignements divers.

Royal Society (*Proceedings*), LXIV, 408, 1899.⊙

Societas Entomologica, XIII, 23, 1899. — Dr E. Fischer : Experimentelle kritische Untersuchungen über das prozentuale Auftreten der durch tiefe Kälte erzeugten Vanessen-Aberrationen. — H. Fruhstorfer : Neue indo-australische Lepidopteren. — P. Born : Meine Exkursion von 1898.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : Ph. François.